



*Centre de Recherche en Défense
Sociale (C.R.D.S.)*

***Newsletter
Septembre 2023***

Direction

Thierry Pham

Secrétariat

Caroline Lecoq

**Psychologues-
chercheurs**

Caroline Benouamer

Denis Delannoy

Xavier Saloppé

Audrey Vinckier

À découvrir :


- Rapport d'activité 2022
- Cahier de publications 2022
- Articles
- Événements à venir

**CENTRE DE RECHERCHE
EN DEFENSE SOCIALE**

Rue Despars, 96
7500 Tournai

www.crd.s.be

Rapport d'activité & cahier de publications 2022



Consultable en ligne via le lien suivant :
[Rapport d'activité 2022](#)

Consultable en ligne via le lien suivant :
[Cahier de publications 2022](#)

Articles

Bertsch, I., Potard, C., Réveillère, C., Pham, T.H., & Courtois, R. (2023) Contribution of a cluster approach to identify the profiles of men sentenced for sexual violence according to their risk of reoffending. *Journal of Interpersonal Violence*, 38(3-4), 2910-2933.

Original Research

Contribution of a Cluster Approach to Identify the Profiles of Men Sentenced for Sexual Violence According to Their Risk of Reoffending

Journal of Interpersonal Violence
2023, Vol. 38(3-4) 2910–2933
© The Author(s) 2022
Article reuse guidelines:
sagepub.com/journals-permissions
DOI: 10.1177/08862605221104529
journals.sagepub.com/home/jiv



Ingrid Bertsch^{1,2,3} , Catherine Potard^{1,3,4},
Christian Réveillère¹, Thierry Hoang Pham^{2,5}, and
Robert Courtois^{1,3}

Abstract

Introduction: The aim of this study is to propose a typology of recidivism risk profiles based on the criminogenic needs of a population of men sentenced for sexual violence. Their socio-demographic, criminological, psychological, and psychiatric factors and vulnerabilities are compared. This classification will respond to the need for a better identification of the factors involved in the risk of recidivism of men sentenced for sexual violence, in order to develop more effective management.

¹Department of Psychology, University of Tours, France

²Department of Forensic Psychology, University of Mons-Hainaut, Belgium

³Centre Ressource pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles Centre Val-de-Loire, University hospital of Tours, France

⁴Department of Psychology, Psychology Laboratory of « Pays de la Loire », University of Angers, France

⁵Centre de Recherche en Défense Sociale, Belgium

Corresponding Author:

Ingrid Bertsch, CRIAVS, Hôpital Trousseau, CHRU de Tours, avenue de la République, 37044 Tours cedex 9, Tours 37020, France.
Email: i.bertsch@chu-tours.fr

Bizige-Ngabo, E., Mungo, A., Loas, G., Saloppé, X., Pham, T., & Hein, M. (2023)
Electroconvulsivothérapie dans les troubles dépressifs majeurs : Quel traitement de relais ?
Acta Psychiatrica Belgica, 123(1), 25-31.

ELECTROCONVULSIVOThÉRAPIE DANS LES TROUBLES DÉPRESSIFS MAJEURS : QUEL TRAITEMENT DE RELAIS ?

ELECTROCONVULSIVE THERAPY IN MAJOR DEPRESSIVE DISORDERS:
WHICH CONTINUATION TREATMENT?

Elysée BIZIGE-NGABO¹, Anaïs MUNGO¹, Gwénolé LOAS¹, Xavier SALOPPE^{2,4}, Thierry PHAM^{5,7}, Mathieu HEIN¹

¹Service de Psychiatrie, Laboratoire du Sommeil, Hôpital Erasme, Université libre de Bruxelles (ULB)

²Centre de Recherche en Défense Sociale, CRDS, Tournai, Belgique

³Univ. Lille, CNRS, UMR 9193 - SCALab - Sciences Cognitives et Sciences Affectives, Lille

⁴Service de Psychiatrie, Hôpital de Saint-Amand-les-Eaux, France

⁵Université UMONS, Belgique

⁶Centre de Recherche en Défense sociale, CRDS, Tournai, Belgique

⁷Institut Philippe-Pinel, Montréal, Canada

Résumé

L'électroconvulsivothérapie (ECT), traitement au taux d'efficacité élevé dans le Trouble Dépressif Majeur (TDM), est associé à un risque de rechute important, d'où la nécessité d'un traitement de relais. L'objectif de cette étude rétrospective est d'investiguer l'impact des antidépresseurs (AD) de 1^{ère} et 2^{ème} génération, ainsi que l'adjonction d'un thymostabilisateur sur le maintien à un an de l'euthymie chez 107 patients adultes ayant bénéficié d'une cure d'ECT. Les individus traités par AD de 1^{ère} génération ou de 2^{ème} génération combiné à un thymorégulateur (lithium) ont un meilleur maintien de l'euthymie à 12 mois comparé aux individus traités par AD de 1^{ère} génération ou 2^{ème} génération. Cette stratégie thérapeutique s'avère être un élément central dans la prise en charge des personnes présentant un TDM ayant bénéficié d'une cure ECT.

Mots-clés : Electroconvulsivothérapie, trouble dépressif majeur, antidépresseurs, thymostabilisateur

Abstract

Electroconvulsive therapy (ECT), a treatment with a high efficacy rate in Major Depressive Disorder (MDD), is associated with a high risk of relapse, hence the need for a continuation treatment. The aim of this retrospective study was to investigate the impact of first- and second-generation antidepressants (AD) and the addition of a thymostabilizer on the maintenance of euthymia at one year in 107 adult patients who had received ECT. Individuals treated with 1st or 2nd generation AD combined with a thymoregulator (lithium) had a better maintenance of euthymia at 12 months compared to individuals treated with 1st or 2nd generation AD. This therapeutic strategy is a central element in the management of people with MDD who have received ECT.

Key words: Electroconvulsive therapy, major depressive disorder, antidepressants, thymostabiliser

Samenvatting

Elektroconvulsie therapie (ECT), een behandeling met een hoge werkzaamheid bij de Major Depressive Disorder (MDD), wordt geassocieerd met een hoog risico van terugval, vandaar de behoefte aan een herhalingsbehandeling. Het doel van deze retrospectieve studie was de invloed te onderzoeken van 1e en 2e generatie antidepressiva (AD), alsmede van de toevoeging van een thymostabilisator, op het behoud van euthymie na één jaar bij 107 volwassen patiënten die ECT hadden ondergaan. Personen die werden behandeld met AD van de 1e of 2e generatie in combinatie met een thymoregulator (lithium) hadden een beter behoud van euthymie na 12 maanden in vergelijking met personen die werden behandeld met AD van de 1e of 2e generatie. Deze therapeutische strategie lijkt een centraal element te zijn in de behandeling van mensen met MDD die ECT hebben ondergaan.

Trefwoorden : Elektroconvulsie therapie, depressieve stoornis, antidepressiva, thymostabilisator

INTRODUCTION

Le Trouble Dépressif Majeur (TDM) constitue un problème majeur de santé publique par son importante prévalence. En effet, 3,8 % de la population est touché avec près de 280 millions de personnes dans le monde¹. Le TDM est donc l'un des troubles psychiatriques les plus répandus. Il provoque une détresse profonde, altère le fonctionnement social et professionnel, engendre des répercussions considérables sur les familles et la société². Il se caractérise par une humeur

dépressive, une diminution de l'intérêt ou du plaisir, une perte ou un gain de poids significatif, des troubles du sommeil, une agitation ou un ralentissement psychomoteur, une fatigue ou une perte d'énergie, un sentiment de culpabilité et de dévalorisation ainsi qu'une diminution à penser ou à se concentrer³. Les idées suicidaires et la planification du suicide sont fréquentes, avec une prévalence respective de 37,7 % et de 15,1 %⁴. Le TDM et ses conséquences peuvent entraîner une

Tiberi, L., Saloppé, X., Vicenzutto, A., Equeter, L., & Pham, T.H. (2023) Reconnaissance des expressions faciales émotionnelles globales et spécifiques (peur et joie) chez les auteurs d'infractions à caractère sexuel : une méta-analyse. *Acta Psychiatrica Belgica*, 123(1), 41-57.

RECONNAISSANCE DES EXPRESSIONS FACIALES ÉMOTIONNELLES GLOBALES ET SPÉCIFIQUES (PEUR ET JOIE) CHEZ LES AUTEURS D'INFRACTIONS À CARACTÈRE SEXUEL : UNE MÉTA-ANALYSE

RECOGNITION OF GLOBAL AND SPECIFIC (FEAR AND HAPPINESS)
FACIAL EXPRESSIONS OF EMOTIONS AMONG SEXUAL OFFENDERS: A META-ANALYSIS

Luca A. TIBERI¹, Xavier SALOPPE², Audrey VICENZUTTO³, Lucas EQUETER⁴, Thierry H. PHAM⁵

¹Forensic Psychology Department, University of Mons (UMONS), Belgium

²Centre of Research in Social Defense (CRDS) Tournai, Belgium, Laboratoire de sciences Cognitives et affectives (SCALab), CNRS, UMR 9193, Université de Lille, France - Service de psychiatrie, Hôpital de Saint-Amand-les-Eaux, France

³Forensic Psychology Department, University of Mons (UMONS), Belgium

⁴Machine Design and Production Engineering Unit, University of Mons (UMONS), Belgium

⁵Forensic Psychology Department, University of Mons (UMONS), Belgium - Centre of Research in Social Defense (CRDS), Tournai, Belgium - Institut Philippe Pinel, Montreal, Canada

Résumé

La reconnaissance des Expressions Faciales Émotionnelles (EFE) joue un rôle central dans nos comportements prosociaux. Peu d'études ont été réalisées auprès des Auteurs d'Infractions à Caractère Sexuel (AICS). Cette méta-analyse compare la précision de la reconnaissance des EFE des AICS avec celle des Auteurs d'Infractions à Caractère Non Sexuel (AICNS) et de la Population Non-Clinique (PNC) (N = 248), à la fois sur un niveau global (six émotions de base) et spécifique (joie et peur). Les résultats indiquent un déficit de reconnaissance des EFE (émotions confondues), et spécifiquement de l'EFE de peur, des AICS lorsque comparés aux AICNS, mais pas à la PNC. Aucune différence n'a été trouvée pour la reconnaissance de l'EFE de joie. Ces résultats sont discutés en tenant compte des considérations méthodologiques. Enfin, cette étude propose des perspectives de recherche sur la reconnaissance des émotions auprès des AICS.

Mots-clés : Emotions, expressions faciales, criminalité

Abstract

Accurate recognition of Facial Expressions of Emotions (FEE) plays a central role in our prosocial behaviors. Although this ability has been investigated among specific populations such as psychopaths, little is known among sexual offenders. This meta-analysis aimed to compare FEE accuracy means between sexual offenders (SO), non-sexual offenders (NSO), and general population (GP) participants (N = 248) both on a global (all six basic emotions combined) and specific (happiness and fear) levels. Results indicate a significant deficit of global and fear-specific FEE recognition among SO when compared to NSO but not to GP. No difference was found for the recognition of FEE of happiness. These findings are discussed considering methodological considerations. Finally, this research outlines the future directions to be undertaken on emotion recognition among sexual offenders.

Key words: Emotions, facial expressions, criminals.

Samenvatting

Accurate herkenning van Gezichtsuitdrukkingen van Emoties (GE) speelt een centrale rol in ons sociaal gedrag. Hoewel dit vermogen is bestudeerd bij specifieke bevolkingsgroepen zoals psychopaten, is er weinig bekend over seksueel delinquenten. Het doel van deze meta-analyse was om de nauwkeurigheid van de GVE te vergelijken tussen seksueel delinquenten (SD), niet-seksueel delinquenten (NSD) en deelnemers uit de algemene bevolking (AB) (N=248), zowel op globaal (de zes basismoties gecombineerd) als op specifiek (geluk en angst) niveau. De resultaten wijzen op een significant tekort in de herkenning van globale en angst-specifieke GE's bij SD's in vergelijking met NSD's, maar niet bij AB's. Er werd geen verschil gevonden voor de erkenning van geluk. Deze resultaten worden besproken in het licht van methodologische overwegingen. Tenslotte vestigt dit onderzoek de aandacht op toekomstige beschouwingen over emotieherkenning bij seksueel delinquenten.

Trefwoorden : Emoties, gezichtsuitdrukkingen, criminaliteit

Bertsch, I., Pham, T., Réveillère, C., & Courtois, R. (2023). Pourquoi l'évaluation structurée du risque de récidive violente et sexuelle est une pratique marginale en France? Revue systématique de la littérature. *Annales Médico-psychologiques*, 181(1), 16-23.

Annales Médico-Psychologiques 181 (2023) 16–23



Disponible en ligne sur
ScienceDirect
www.sciencedirect.com

Elsevier Masson France
EM|consulte
www.em-consulte.com



Article original

Pourquoi l'évaluation structurée du risque de récidive violente et sexuelle est une pratique marginale en France ? Revue systématique de la littérature

Why is structured assessment of the risk of violent and sexual recidivism a marginal practice in France? A systematic review

Ingrid Bertsch^{a,b,d,*}, Thierry Pham^{c,d}, Christian Réveillère^a, Robert Courtois^{a,b}

^a EE 1901 Qualipsy (qualité de vie et santé psychologique), département de psychologie, université de Tours, 37041 Tours cedex 1, France
^b CRIAVS Centre-Val de Loire, CHRU de Tours, 37044 Tours cedex 9, France
^c Centre de recherche en défense sociale, 94, rue Despars, 7500 Tournai, Belgique
^d UMONS, université de Mons, 20, place du Parc, 7000 Mons, Belgique

INFO ARTICLE

Historique de l'article :
Reçu le 24 février 2021
Accepté le 27 mai 2021
Disponible sur Internet le 16 juin 2021

Mots clés :
Auteur de violence sexuelle
Échelle d'évaluation
Évaluation du risque
Récidive

RÉSUMÉ

Introduction. – En France, l'évaluation structurée du risque de récidive est peu développée face au jugement professionnel non structuré, pourtant moins valide.
Objectif. – Cet article propose une revue systématique de la littérature, répondant aux critères PRISMA, sur la perception et la pratique de l'évaluation structurée, en France, chez les professionnels concernés.
Méthode. – Les mots clés « Évaluation du risque » AND « récidive » AND « France » ont été recherchés dans Pubmed, PsycInfo, Cairn et ScienceDirect.
Résultats. – Les 23 articles obtenus dans les résultats montraient des craintes et peu d'avantages concernant l'évaluation structurée, la possibilité d'un système hybride et les quelques travaux français utilisant des échelles de risque. Ces réticences concernaient : (i) le système judiciaire français (notamment le tout actuel) ; (ii) les professionnels évaluateurs (confusion des rôles entre professionnels) ; (iii) les personnes évaluées (risque de stigmatisation des infracteurs à haut risque) ; et (iv) les outils eux-mêmes (prédictivité modérée).
Discussion et conclusion. – La validité scientifique, clinique et les garanties éthiques des échelles structurées du risque sont pourtant suffisantes pour permettre leur développement en France. Quelques hypothèses sont avancées pour expliquer les réticences à leur généralisation en France.

© 2021 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

ABSTRACT

Introduction. – In France, the recidivism of offenders (both sexual and non-sexual violence) is a national concern as evidenced by the media and the succession of laws relating to the prevention of recidivism. Risk assessment can be performed using unstructured professional judgment which is unreliable or by structured risk assessment which are more reliable. Abroad, this structured assessment is considerably developed. In France, it gives rise to two opposing positions: (i) encouragement by public authorities; and (ii) fear by a majority of professionals in the field.
Objective. – This article offers a systematic literature review, meeting PRISMA criteria, on the perception and practice of standardized evaluation in France by the professionals concerned.
Method. – The keywords "Risk assessment" AND "recurrence" AND "France" were searched in French and in English in the search engines Pubmed, PsycInfo, Cairn, and ScienceDirect.
Results. – The 23 articles obtained in the results highlighted: (a) fears and few advantages regarding the use of structured evaluation; (b) a possibility of a hybrid evaluation system in France; and (c) a report of

* Auteur correspondant.
Adresse e-mail : ibertsch@chu-tours.fr (I. Bertsch).

<https://doi.org/10.1016/j.amp.2021.05.009>
0003-4487/© 2021 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Dujardin, F., Pham, H.T., Lefebvre, E., Delsinne, P., & Saloppé, X. (2023). L'empowerment des usagers en santé mentale. Satisfaction du club thérapeutique : quel lien avec la qualité de vie et le soutien social perçus ? *Annales Médico-Psychologiques*, 181(7), 604-613.



Disponible en ligne sur

ScienceDirect
www.sciencedirect.com

Elsevier Masson France

EM|consulte
www.em-consulte.com



Article original

L'empowerment des usagers en santé mentale. Satisfaction du club thérapeutique : quel lien avec la qualité de vie et le soutien social perçus ?



The empowerment of mental health users. Satisfaction of a therapeutic club: What is the link between perceived quality of life and social support?

France Dujardin^a, Thierry H. Pham^{b,c,d}, Elinne Lefebvre^b, Perle Delsinne^b,
Xavier Saloppé^{c,e,f,*}

^a Centre régional psychiatrique « Les Marronniers », Tournai, Belgique

^b Université UMONS, Mons, Belgique

^c Centre de recherche en défense sociale, CRDS, Tournai, Belgique

^d Institut Philippe-Pinel, Montréal, Canada

^e CNRS, UMR 9193 - SCALab - sciences cognitives et sciences affectives, University Lille, 59000 Lille, France

^f Service de psychiatrie, hôpital de Saint-Amand-les-Eaux, Saint-Amand-les-Eaux, France

INFO ARTICLE

Historique de l'article :

Reçu le 1^{er} octobre 2021

Accepté le 8 avril 2022

Disponible sur Internet le 5 novembre 2022

Mots clés :

Accompagnement

Autonomisation

Club thérapeutique

Qualité de vie

Santé mentale

RÉSUMÉ

Objectifs. – L'empowerment se réfère au pouvoir d'agir d'un individu et/ou d'une collectivité. Il influe sur la qualité de vie et le soutien social perçus des individus. À notre connaissance, aucune étude n'a examiné ces liens parmi des usagers de la santé mentale en Belgique francophone. Cette étude évalue les liens existant entre la satisfaction des usagers, en lien avec la promotion de l'empowerment et ses conséquences sur la qualité de vie et le soutien social perçus au sein d'un club thérapeutique.

Méthode. – Quarante-quatre usagers du club thérapeutique le « B'eau B'art » sont évalués au questionnaire de satisfaction du B'eau B'art, à sa version *empowerment*, au WHOQOL-bref mesurant la QdV générique et au SSQ6 évaluant le soutien social perçu.

Résultats. – Les usagers sont globalement satisfaits du club, hormis dans le domaine des relations sociales et de la participation aux décisions.

Conclusion. – La satisfaction liée à l'empowerment prôné au sein d'un club thérapeutique comme le B'eau B'art a des conséquences positives sur la qualité de vie et le soutien social perçus des usagers.

© 2022 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

ABSTRACT

Objective. – Empowerment refers to an individual's power to act. Within clubs, this concept represents an issue that influences the perceived Quality of Life (QoL) and social support of users. To our knowledge, no prior study has examined its links among French-speaking mental health users in Belgium. This study assesses the associations between user satisfaction in relation to the promotion of empowerment and its consequences on the perceived QoL and social support within a clubhouse.

Method. – Forty-four adults suffering from a mental disorder of the clubhouse entitled "B'eau B'art" were evaluated with the empowerment version of the B'eau B'art satisfaction questionnaire (QSBB-empowerment), the WHOQOL-brief measuring generic QoL and SSQ6 assessing perceived social support.

Keywords:

Empowerment

Clubhouse

Mental health

Quality of life

Social support

* Auteur correspondant.

Adresse e-mail : xavier.saloppe@crds.be (X. Saloppé).

<https://doi.org/10.1016/j.amp.2022.04.017>

0003-4487/© 2022 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Événements à venir :

Société Médico-Psychologique

Fondée en 1852 – Reconnue d'utilité publique en 1867



[Le site de la SMP](#)

Cher(e)

Paris, le 28 août 2023
collègue,

J'ai le plaisir de vous informer que la Société Médico-Psychologique tiendra une **séance thématique (Avancée de la recherche en psychiatrie-psychologie légale)** le **lundi 25 septembre 2023**, à partir de **10 heures**, à l'hôpital Sainte-Anne, Pavillon Jean Delay, Amphithéâtre Deniker, 1, rue Cabanis, 75014 Paris (prendre tout de suite à droite dès l'entrée dans l'hôpital) et également par visioconférence. Je souhaite vivement votre participation à cette séance.

Je vous prie de croire, cher(e) collègue, en l'assurance de toute ma considération.

Le secrétaire général
[Docteur Yann Auxéméry](#)

Prochaines séances de la Société Médico-Psychologique

Lundi 27 octobre 2023, 13-17 heures – séance thématique

(Histoire et épistémologie de la pédopsychiatrie)

Jeudi 16 novembre 2023 – 180e anniversaire des Annales Médico-Psychologiques

à l'Académie de médecine

(La place de l'écrit aujourd'hui dans la transmission du savoir en psychiatrie et psychologie clinique)

Lundi 27 novembre, séance « du président », à Toulon, HIA Sainte-Anne

(Le soin psychique. Entre l'impasse de son actualité et les enjeux de son avenir, une tentative de définitions)



Réunion Zoom planifiée.

Sujet : Séance SMP

Heure : 25 septembre 2023 10:00 AM Paris

Participer à la réunion Zoom : [Lien pour le zoom](#)

ID de réunion : 864 4505 9606

Code secret : 835608

Une seule touche sur l'appareil mobile

+33186995831,,86445059606#,,,,*835608# France

+33170372246,,86445059606#,,,,*835608# France

Lundi 25 septembre 2023

Hôpital Sainte-Anne, Amphithéâtre Deniker
et par visioconférence

10 heures – 17 heures

COMMUNICATIONS

Avancée de la recherche en psychiatrie-psychologie légale

(Séance thématique proposée par Thierry Pham)

Présidence : Charles Gheorghiev

Communication du secrétaire général, le Dr Yann Auxéméry

Ouverture des travaux à 10 heures

1. Thomas FOVET (Paris) – Épidémiologie des troubles psychiatriques en milieu pénitentiaire en France.
2. Emma ROUCHY, Matthieu GARCIA, Patrick LEBIHAN, Gregory MICHEL (Bordeaux) – Expériences d'adversités durant l'enfance chez des auteurs d'homicides hospitalisés en milieu fermé (UMD) : une étude descriptive.
3. Raphaëlle JOUIN (Amiens) – Implémentation de la HCR-20 à la prison d'Amiens.
4. Matthieu LACAMBRE (Montpellier) – Auteurs de violences sexuelles : Prise en charge ambulatoire en France.
5. Michèle JANSSENS, Caroline BENOUMER, Thierry H. Pham (Bruxelles) – Étude de genre chez les auteurs de violences sexuelles : focus sur les violeurs antisociaux.

13 heures – Interruption des travaux

Reprise des travaux à 14h30

6. Robert COURTOIS et al. (Tours) – Violence conjugale : Implémentation de recherche.
7. Audrey VICENZUTTO, Anye MIERMONT, A.F. ANCIAUX, Samuel LEISTEDT (Tournai, Bruxelles, Mons) – Intérêts et enjeux de l'évaluation structurée du risque de violence conjugale au sein du parcours judiciaire : Présentation d'un projet de recherche.
8. Luca TIBERI, Audrey VICENZUTTO (Tournai) – Évaluation des compétences émotionnelles des psychologues en milieu carcéral et médico-légal.
9. Émilie TELLE, Thierry H. PHAM, Audrey VICENZUTTO (Mons) – Intérêts et enjeux d'étudier les troubles mentaux courants et l'usage de la force chez les policiers.

Posters

1. Audrey VINCKIER, Xavier SALOPPE, Fanny DEGOUIS, Benjamin DELAUNOIT, Thierry H. PHAM (Tournai) – Suivi longitudinal d'une cohorte de patients internés : taux de récidive et niveaux de risque.
2. Caroline BENOUMER, Thierry H. PHAM (Tournai) – Projet de suivi des auteurs de violences sexuelles : Intérêts et limites des facteurs protecteurs.

Les comptes rendus des communications et une synthèse de cette journée, incluant les discussions avec l'auditoire, seront publiés dans les Annales Médico-Psychologiques (n° 2, 2024)

Entrée libre, mais inscription obligatoire auprès de [Jacqueline Parant](#)

Secrétaire administrative

[Jacqueline Parant](#)

14/16 avenue Robert Schuman - 92100 - Boulogne Billancourt

Vous pouvez mettre à jour vos données ou vous désabonner à tout moment, en [clicquant ici](#)



Message neutre en CO₂

CIFAS

4 AU 7 JUIN
2024

CIFAS 2024

Université de Lausanne,
Suisse

DU RÉEL AU VIRTUEL : L'AGRESSION SEXUELLE
AUJOURD'HUI

Davantage d'informations suivront sous peu.

2024 IAFMHS CONFERENCE
SAN FRANCISCO | JUNE 18 - 20

INTERNATIONAL
ASSOCIATION OF



FORENSIC MENTAL
HEALTH SERVICES



**Merci et à très vite pour notre
prochaine newsletter !**